




ПРОФІЛАКТИКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ШЛЯХУ ПЕРЕДАЧІ ВІЛ В УКРАЇНІ

Мар'яна Служинська
Львівський обласний центр громадського здоров'я


Шляхи передачі ВІЛ-інфекції в Україні

2018 рік




- Гетеросексуальний шлях інфікування
- Гомосексуальний шлях інфікування
- Введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом
- Діти, які народжені ВІЛ-позитивними жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції підтверджений

2019 рік



- Гетеросексуальний шлях інфікування
- Гомосексуальний шлях інфікування
- Введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом
- Діти, які народжені ВІЛ-позитивними жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції підтверджений

Статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції серед осіб з вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції в Україні у 2019 році за адміністративно-територіальними одиницями







EACS European
AIDS Clinical Society

Обсяги тестування населення на ВІЛ-інфекцію та виявлення ВІЛ-інфікованих в Україні 2017-2019


2019 рік



2018 рік




2017 рік



0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000


Порівняння тестування вагітних і інших контингентів населення в Україні

2018 рік



■ Інші контингенти ■ Вагітні

2019 рік




■ Інші контингенти ■ Вагітні

Динаміка кількості тестування вагітних на ВІЛ-інфекцію та виявлення ВІЛ-інфікованих в Україні за період 2017-2019



EACS European AIDS Clinical Society



Глобальна стратегія здоров'я ВООЗ щодо відсутності нових випадків ВІЛ серед немовлят як загрози громадському здоров'ю до 2030 року.

WHO Global Health Strategy on No New Infant HIV as a Threat to Public Health by 2030



Наказ МОЗ України від 15.12.2003 N 582 “Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги”

- дворазове обстеження вагітних на ВІЛ
- зидовудин з 28 тижнів вагітності
- відміна після пологів



EACS European
AIDS Clinical Society


Наказ МОЗ України №716 від 14.11.2007р. “Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги “Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини”

- дворазове обстеження вагітних на ВІЛ
- призначення 3 антиретровірусних препаратів з 24 тижнів вагітності
- відміна після пологів

Наказ №449 від 16.05.2016р. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини»

- триразове обстеження вагітних на ВІЛ (у випадку належності пацієнтки до представників уразливих груп або у випадку дискордантних пар)
- призначення АРТ відразу після встановлення ВІЛ(+) статусу
- основною стратегією програм ППМД в країні визначено опцію «В+»
- продовження АРТ після пологів


Термін встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції у вагітних жінок






EACS European
AIDS CI

Частота вертикальної трансмісії в Україні за результатами когортного аналізу, при встановленні остаточного діагнозу ВІЛ-інфекції дітям, народженим ВІЛ-позитивними жінками (%), 2001-2017 рр.




Кількість ВІЛ-позитивних вагітних жінок та народжених ними дітей в Україні, 2015-2019 рр.





EACS European AIDS Clinical Society

Діти, народжені ВІЛ-позитивними жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено, в Україні за період 2017-2019 років




Взято на облік дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено протягом звітного року

Перебуває на обліку на кінець звітного року осіб з діагнозом ВІЛ-інфекції



Діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження, Україна 2017-2019




Взято на облік протягом звітного року осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції

Перебуває на обліку на кінець звітного року осіб з діагнозом ВІЛ-інфекції




EACS European AIDS CII

Відсоток дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, які пройшли вірусологічне тестування на ВІЛ протягом перших 2 місяців від народження, у регіонах України у 2019 році.



Частота передачі ВІЛ від матері до дитини по регіонах України за даними ранньої діагностики ВІЛ-інфекції (%), у 2019 році





Медичне обслуговування в Україні з 1 квітня 2020 року

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 року №65
“Деякі питання реалізації програми державних гарантій
медичного обслуговування населення у 2020 році” з 1 квітня 2020
року розпочато фінансування закладів охорони здоров’я
екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної
(високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги,
медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років,
медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
Національною службою здоров’я України.

Стандарти обстеження жінок під час вагітності

ЗОЗ, який уклав договір з НСЗУ на амбулаторний пакет має забезпечити проведення всіх необхідних обстежень відповідно до галузевих стандартів, зокрема й обстеження жінок на ВІЛ-інфекцію.

Наказ МОЗ України №449 Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги "Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини"



EACS European
AIDS Clinical Society

Законодавство України щодо обстеження вагітних на ВІЛ

Відповідно до вимог *ст. 15 Закону України “Основи законодавства України про охорони здоров’я”*... реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я в адміністративно-територіальних одиницях України здійснюють... місцеві державні адміністрації”, що повинні забезпечити доступ усіх вагітних до безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію, яке гарантується *ст.6 Закону України “Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ”*.



EACS European
AIDS Clinical Society

Характеристика показників стану виконання програми вертикальної трансмісії в 2019 році

- Загальна кількість ВІЛ-позитивних вагітних - 2203
- Загальна кількість пологів - 2083
- Поширеність ВІЛ серед вагітних - 0,72
- Охоплення вагітних тестуванням на ВІЛ – 99,3%

- Показник охоплення антиретровірусним лікуванням ВІЛ-позитивних жінок - 95,6%
- Продовжують АРТ після пологів понад 93,4% ВІЛ-позитивних жінок
- Зростає кількість частка жінок з встановленим ВІЛ-позитивним статусом до вагітності – з 54,2% у 2017 році до 65,2% у 2019 році

- Кесарів розтин, як спосіб розродження був проведений 27,2% ВІЛ-позитивних роділь (у 2018 році- 31,0%)
- У 2019 році серед 766 жінок, які дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус під час вагітності та пологів, діагноз ВІЛ-інфекції був встановлений переважно у II триместрі вагітності – 44,9%.

У III триместрі та після пологів загалом діагноз був встановлений у 26,4% випадків, тобто практично кожна 4 жінка своєчасно не отримала комплекс медичних послуг з ППМД, що суттєво підвищувало ризик інфікування ВІЛ своєї дитини.



- У 2019 році ЧПМД в Україні за даними ранньої діагностики ВІЛ-інфекції становила 1,6% - 31 випадок передачі ВІЛ від матері до дитини.
- ЧПМД була розрахована за результатами когортного аналізу при встановленні остаточного діагнозу ВІЛ-інфекції серед дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками у 2017 році – 3,3 %

Подяка

Центр громадського здоров'я МОЗ України

Регіональні центри з профілактики та боротьби зі СНІДом

Регіональні центри громадського здоров'я

Львівський обласний центр громадського здоров'я



 EACS European
AIDS Clinical Society

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

